


TESTAJE DE SEMENTALES: CAMPYLOBACTER FETUS VENEREALIS Y TRITRICHOMONAS FOETUS



¿CUÁNDO SE DEBE HACER EL TESTAJE?



Ingreso en **centros autorizados de recogida de semen**




Traslado de machos entre explotaciones



Participación en **ferias ganaderas**



Síntomas compatibles con enfermedades venéreas



Vigilancia en explotaciones ganaderas



AGENTES ETIOLÓGICOS

- **Transmisión venérea** por contacto sexual, principalmente en sistemas de monta natural.
- El **toro** actúa como **portador y diseminador**, mientras que los **signos clínicos** son evidentes solo en **hembras**, manifestándose como **problemas reproductivos**.
- **No afectan la capacidad fecundante del semen** de los toros, ni su estado general.


Campylobacter fetus venerealis

- Toros: portadores asintomáticos, transmisión venérea por contacto sexual.
- Vacas:
 - Infertilidad debido a muerte embrionaria precoz, repetición de celos, abortos ocasionales y endometritis.
 - La infección suele ser transitoria, pero algunas se convierten en portadoras crónicas durante meses hasta más de un año.



Tritrichomonas foetus

- Toros: portadores asintomáticos, transmisión venérea por contacto sexual.
- Vacas:
 - Infertilidad debido a muerte embrionaria precoz, repetición de celos, abortos ocasionales y piometra (inflamación purulenta del útero).
 - Generalmente se elimina la infección espontáneamente después de algunos meses.



RECOGIDA DE MUESTRAS

El **diagnóstico** se realiza mediante la **toma de muestras de esmegma prepucial**, utilizando técnicas de **raspado**. Se recomienda que el toro tenga un reposo sexual de al menos 2 semanas antes del muestreo para aumentar la probabilidad de detectar los patógenos.



Limpiar la zona del prepucio con agua y secarla. Evitar el uso de desinfectantes que puedan afectar la viabilidad de los microorganismos.



Introducir el raspador hasta el fondo de la cavidad prepucial y realizar entre 20 y 30 movimientos suaves en sentido antero-posterior, raspando la mucosa prepucial y la zona del glande.



Extraer el raspador, cortar el cabezal roscado del raspador e introducirlo en el tubo con el medio de transporte.



Las muestras se deben transportar refrigeradas, asegurando que lleguen al laboratorio en menos de 48 horas. Si el envío se demora más, pueden conservarse congeladas.




Se debe evitar la contaminación con heces; si la muestra está contaminada, se recomienda realizar un lavado prepucial con solución salina estéril antes de repetir el raspado.

¿NECESITAS REALIZAR UN TESTAJE?



Nosotros te proporcionamos el
material: raspadores y medios
de transporte

Informe de resultados en
24-48 horas (PCR)





¿Necesitas realizar un testaje de
sementales?



**¡ NO DUDES EN
CONTACTARNOS !**



 analitica@analiticaveterinaria.com

 +34 946 74 42 51

 Aritz bidea, 18 bajo, 48100 Mungia, Bizkaia

 www.analiticaveterinaria.com

